

*Петра Шкет, д-р мед., специалист в области акушерства и гинекологии*

*«Это минимально инвазивный метод, при котором лазерное излучение, воздействуя теплом, влияет на коллагеновые волокна в ткани влагалища и эндопельвикальные фасции. Вызывает преобразование, перераспределение и повторный рост коллагена. Новейший и очень эффективный метод лечения недержания мочи и синдрома рыхлого влагалища представляет именно использование лазерной технологии. Метод эффективен, прост и безопасен».*




ИСТОЧНИК  
ЗДОРОВЬЯ



ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОБЛЕМ И ОМОЛОЖЕНИЕ  
С ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШЕЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ –  
ФРАКЦИОНИРОВАННЫМ ЛАЗЕРОМ  
ERBIUM YAG

## СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (СНМ)




Стрессовое недержание мочи является распространенной проблемой у женщин. Это проявляется как непроизвольное подтекание мочи при физической нагрузке, кашле, чихании, беге, во время полового акта. Трудности возникают из-за естественного процесса старения, наследственной предрасположенности, гормональных изменений во время беременности и менопаузы, а также из-за механических изменений после вагинальных родов. Эти проблемы усугубляет длительное увеличение внутрибрюшного давления (поднятие тяжестей, хронический кашель, ожирение).

### КОМУ ТЕРАПИЯ НЕ ПОДХОДИТ?

Терапия с помощью эрбиевого фракционированного лазера не подходит для пациентов, имеющих гиперчувствительную к солнечному свету кожу или открытые раны в области, предусмотренной для лечения, из-за повреждений, облучения или химиотерапии.

## СИНДРОМ РЫХЛОГО ВЛАГАЛИЩА



Когда женщина замечает, что ощущение во влагалище больше не такое как прежде, что сексуальные переживания становятся менее интенсивными, или имеет слишком широкое влагалище, можно говорить о синдроме рыхлого влагалища. Наиболее частыми причинами являются чрезмерное растяжение влагалища во время родов, слабость соединительной ткани и старение. В период менопаузы и после него таким образом уменьшим дискомфорт и боль, вызванные сухостью влагалища, вернем уверенность и радость секса. Полный эффект лечения достигается после трех облучений.

Не подходит для тех, кто недавно перенес инфекцию с вирусом простого герпеса, болен раком, имеет нереальные ожидания или же не хочет или не в состоянии следовать инструкциям по уходу за кожей после лечения.

## ВМЕШАТЕЛЬСТВА С ЛАЗЕРОМ ERBIUM YAG

### Стрессовое недержание

первое вмешательство	300 €
второе вмешательство	250 €
третье и четвертое вмешательство	150 €

### Увеличение упругости влагалища

первое вмешательство	300 €
второе вмешательство	250 €
третье и четвертое вмешательство	150 €

### Увеличение упругости влагалища и одновременное лечение стрессового недержания мочи

первое вмешательство	500 €
второе вмешательство	400 €
третье и четвертое вмешательство	300 €